

توصیه های مفید در پیشگیری از مسمومیت کودکان

۱. چنانچه در خانه کودک زیر ۵ سال دارید، حتماً داروها را در کمدهای بالا، دور از دسترس و مجهر به قفل قرار دهید.
۲. مراقب باشید تا در هنگام بیماری کودک، دوز تکراری و یا داروی بیشتر از حد تجویز شده به کودک ندهید. به عنوان مثال برای کاهش تب در کودکان، داروی استامینوفن را بر اساس وزن و سن کودک و با مشورت پزشک و داروساز به کودک بدهید. مقادیر بیش از حد درمانی استامینوفن می تواند ایجاد مسمومیت نماید.
۳. جهت دادن دارو به کودکان از وسایل اندازه گیری دقیق همانند قطره چکان، فنجان مدرج، قاشق های سیلندری مدرج و یا سرنگ (بدون سوزن) استفاده نمایید تا دقیقاً مقداری که پزشک تجویز کرده است را به کودک بدهید.
۴. قاشق های مربا خوری و یا غذا خوری موجود در منازل استاندارد نیستند و حجم های متفاوت دارند. بنابراین از پزشک و یا داروساز بخواهید مقدار مصرفی را بر اساس قطره یا میلی لیتر تعیین کند تا دارو را با وسایل اندازه گیری دقیق بتوانید به کودک بدهید.
۵. چنانچه کودک از خوردن دارو امتناع میکند و برای خوراندن دارو به کودک قصد دارد دارو را همراه با نوشیدنی و یا مواد خوراکی دیگر به کودک بدهید، حتماً با پزشک یا داروساز مشورت نمایید تا تداخل و یا ناسازگاری با هم نداشته باشد.
۶. داروهای مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس کودکان نگهدارید. از قرار دادن دارو در کیف دستی پرهیز کنید تا مانع خورده شدن دارو توسط کودکان شود.
۷. داروهای خود را در مقابل چشم کودکان نخورید، چرا که کودکان از رفتار بزرگسالان تقلید می کنند و ممکن است دور از چشم والدین داروها را به دهان ببرند.
۸. اگر به کودک خود دارو می دهید به او تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتی مثل آبنبات، شکلات و یا خوراکی استفاده نکنید.
۹. داروها خصوصاً داروهای خوش طعم مخصوص داروهای کودکان را از دسترس ایشان دور نگه دارید. ممکن است با استفاده از غفلت شما، کودک اقدام به مصرف دارو نماید.

۱۰. کودکان کنچکاوند و ممکن است زمانی که افراد سالمند فامیل در حال مصرف داروهای خود می باشند، کودکان اقدام به چشیدن و یا بلعیدن دارو نمایند. بنابراین برای پیشگیری از مسمومیت دارویی کودک دلبندتان، از والدین خود بخواهید داروهای مصرفی خود را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایند.
۱۱. داروها را در بسته بندی اولیه آنها نگهداری نمایید تا در هنگام بروز مسمومیت بتوانید اطلاعات درستی را در مورد داروی مصرفی به پزشک ارائه نمایید.
۱۲. چنانچه فردی در خانواده در حال درمان ترک اعتیاد می باشد، از دسترسی کودکان به داروهای درمان کننده اعتیاد مانند قرص یا شربت متادون جداً خودداری نمایید. مرگ بسیاری از کودکان و حتی بزرگسالان به دلیل نگهداری شربت متادون در یخچال مخصوصاً به دلیل تعویض بطری دارو با بطری داروهای دیگر و یا نوشیدنی ها خوراکی و مصرف اتفاقی آنها صورت گرفته است است.
۱۳. از نگهداری شربت متادون در داخل یخچال و در کنار بقیه نوشیدنی ها خودداری نمایید.
۱۴. شربت متادون جهت درمان ترک اعتیاد، بسیار سمی است. آن را دور از دسترس خانواده و در کمد قفل دار نگهداری نمایید.
۱۵. به کودکان بیاموزید هیچ چیزی ننوشند و یا نخورند مگر اینکه با اجازه بزرگسالان باشد.
۱۶. در هنگام استفاده از محصولات شیمیایی و پاک کننده چنانچه مجبور شدید به زنگ درب ورودی و یا تلفن جواب دهید، قبل از هر چیز درب ظرف را ببندید و هرگز از کودک خود چشم برندارید.
۱۷. عمدۀ ترین موارد مسمومیت در کودکان در اثر خوردن داروها، مواد شیمیایی و محصولات خانگی مانند مواد آرایشی بهداشتی، فرآورده های شوینده، سفیدکننده و لوله باز کن، لاک پاک کن (استون) و گیاهان آپارتمانی سمی بوده است.
۱۸. گلهای و گیاهان آپارتمانی را دور از دسترس کودکان قرار دهید و هنگام بازی کودکان در فضای باز مراقب آنها باشید تا توسط گلهای و گیاهان سمی، مسموم نشوند.

۱۹. نام گیاهان و گلهای آپارتمانی سمی مانند خرزهه و دیفن باخیا را به خاطر بسپارید از نگهداری آنها در منازلی که دارای کودک می باشد خودداری نمایید. تماس پوست با آنها و یا به دهان بردن آنها منجر به مسمومیت و سوختگی مخاط می شود.
۲۰. مسمومیت اتفاقی در اثر بلع نفت در کودکان بسیار خطرناک می باشد. در صورت بلع نفت توسط کودک هر چه سریع ترا او را نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل نمایید.
۲۱. اگر کودکی نفت را ببلعد کشنه نیست ولی اگر کودک وادار به استفراغ شود این امر می تواند منجر به مرگ وی شود.
۲۲. هیچگاه الكل و ضد یخ را در دسترس کودکان قرار ندهید
۲۳. کیف دستی، ساک خرید و کیسه های نایلونی را دور از دسترس کودکان قرار دهید. ممکن است داخل آنها وسایلی باشد که توسط کودک بلعیده شود و یا کودک ضمن بازی آنها را روی سر خود کشیده و سبب خفگی وی شود.
۲۴. کودکان به دلیل روند رشدشان اغلب دست و اجسام اطراف خود را به دهان می بردند. این کار سبب ورود مقادیری از سرب محیط به بدنشان می شود.
۲۵. کودکان ۴ تا ۵ برابر بیشتر از بزرگسالان، سرب محیط را جذب می کنند.
۲۶. کودکان زیر ۵ سال و زنان باردار دو گروه اصلی در معرض خطر در اثر تماس با سرب هستند.
۲۷. اصلی ترین عوارض سوء سرب در تکامل سیستم عصبی کودکان و بهره هوشی کودک بروز می نماید.

