



معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

دپاکلیفلوزین

امپاکلیفلوزین / لیناگلیستین / متفورمین

قابستان

۱۴۰۱

تنظیم و تدوین:

دکتر علیرضا استقامتی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امیرحسام علیرضایی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فاطمه قائمی، دانشیار معاونت درمان ستاد وزارت بهداشت
دکتر محمد ابراهیم خمسه، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر صغری ربیع زاده، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجید ولی زاده، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مهدی حفیظی، معاون مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها
دکتر نسرين بیات، رییس گروه درمان بیماریهای غیر واگیر معاونت درمان
دکتر ساناز بخشنده، رییس اداره تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان
آزاده حقیقی، کارشناس معاونت درمان
مرجان مستشار نظامی، کارشناس معاونت درمان

تحت نظارت فنی

گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سلامت
دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعرفه سلامت
دکتر ساناز بخشنده، دکتر موسی طباطبایی لطفی

بسمه تعالی
راهنمای تجویز

دوز و تواتر انجام و شرایط تجویز	محل تجویز	شرط تجویز		افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	کاربرد دارو	نام دارو
		کنترا اندیکاسیون	اندیکاسیون			
بزرگسالان، دوز اولیه: ۵ میلی گرم خوراکی یک بار در روز	مطب درمانگاه بیمارستان	<p>* حساسیت مفرط به دارو و یا اجزای تشکیل دهنده دارو</p> <p>* کتوا سیدوز دیابتی (افزایش کتون ها در خون یا ادرار).</p> <p>* بیماران دیالیزی</p> <p>* نارسایی کلیه شدید (eGFR < 30 mL/min/1.73 m²) ,</p> <p>* بیماری کلیه مرحله پایانی</p> <p>* در بیماران که نیاز به جراحی دارند، مصرف دارو حداقل ۳ روز قبل از جراحی باید به صورت موقت متوقف شود.</p> <p>* بارداری و شیردهی</p>	<p>* در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ ترجیحاً به عنوان خط بعدی در مان پس از متفورمین می تواند مد نظر باشد.</p> <p>* به عنوان در مان دارویی همراه رژیم غذایی و ورزش جهت بهبود کنترل قند خون.</p> <p>* در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ همراه با بیماری نارسایی قلبی</p> <p>* در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ همراه با اختلال عملکرد کلیه یا دفع پروتئین</p> <p>* بیماران مبتلا به نارسایی قلبی غیردیابتی همراه با درمانهای لازم</p> <p>* بیماران مبتلا به نارسایی کلیه غیردیابتی همراه با درمانهای لازم</p>	<p>- پزشک عمومی</p> <p>- متخصص بالینی</p>	<p>سرپایی بستری</p>	<p>داپاگلیفلوزین Dapagliflozin</p> <p>حاوی دوز های:</p> <p>- ۵ میلی گرم</p> <p>- ۱۰ میلی گرم</p>

نام دارو	کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	شرط تجویز		محل تجویز	دوز و تواتر انجام و شرایط تجویز
			اندیکاسیون	کنترل اندیکاسیون		
لیناگلیپتین / امپاگلیفلوزین / متفورمین (Empagliflozin/ Linagliptin/ Metformin) حاوی دوز های: * ۱۰ میلی گرم / لیناگلیپتین ۵ میلی گرم / متفورمین ۱۰۰۰ میلی گرم * ۵ میلی گرم / لیناگلیپتین ۲,۵ میلی گرم / متفورمین ۱۰۰۰ میلی گرم * ۱۲,۵ میلی گرم / لیناگلیپتین ۲,۵ میلی گرم / متفورمین ۱۰۰۰ میلی گرم * ۲۵ میلی گرم / لیناگلیپتین ۵ میلی گرم / متفورمین ۱۰۰۰ میلی گرم	سرپایی بستری	- پزشک عمومی - متخصص بالینی ^۱	* در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ * به عنوان در مان دارویی همراه رژیم غذایی و ورزش جهت بهبود کنترل قند خون بیماران دیابت نوع ۲ که با دو دارو کنترل نیستند. * در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ همراه با بیماری شناخته شده قلبی و عروقی که مصرف هر دو داروی امپاگلیفلوزین و لیناگلیپتین مناسب است و امپاگلیفلوزین جهت کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری قلبی و عروقی توصیه میشود.	* کنترل اندیکاسیون * دیابت نوع ۱ * کتواسیدوز دیابتی * اسیدوز متابولیک * برای بهبود کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ با اختلال شدید کلیوی (eGFR کمتر از 30 ml/min/1.73m2) * بیماران تحت دیالیز * در بیمارانی که نیاز به جراحی دارند، م صرف دارو حداقل ۳ روز قبل از جراحی باید به صورت موقت متوقف شود. * بارداری و شیردهی	مطب درمانگاه بیمارستان	* بزرگسالان: در شروع، یک قرص لیناگلیپتین ۲,۵ میلی گرم / امپاگلیفلوزین ۵ میلی گرم / متفورمین ۱۰۰۰ میلی گرم یکبار در روز هنگام صبح است. بر اساس تحمل بیمار، مقدار مصرف توسط پزشک ممکن است به حداکثر یک قرص لیناگلیپتین ۵ میلی گرم / امپاگلیفلوزین ۲۵ میلی گرم / متفورمین ۱۰۰۰ میلی گرم در روز افزایش یابد. * در بیماران با اختلال عملکرد کبد توصیه نمیشود.

^۱ در ابلاغیه شماره ۴۰۰/۶۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ داروهای خوراکی دیابت نوع ۲، منظور از متخصص، متخصص بالینی می باشد.